

令和6年版福島県農作物病害虫防除指針の変更

○令和6年5月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ	作物名	農薬名	変更があった箇所	変更前	変更後	変更月日
P50	ダイズ	マラソン乳剤	対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法(薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	5月15日
P70	水稲	バスタ液剤	使用時期	収穫7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	収穫7日前まで (雑草生育期)	5月29日
			使用方法等	2 本剤の使用回数は2回以内	2 本剤の使用回数は3回以内	
P123	キュウリ	マラソン乳剤	対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	5月15日
P128	カボチャ		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P129	メロン		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P137	サヤインゲン		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
			対象病害虫「アザミウマ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P138	サヤエンドウ 美エンドウ		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
			対象病害虫「アザミウマ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P150	ネギ		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P151			対象病害虫「アザミウマ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
P153	タマネギ		対象病害虫「アブラムシ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍	
		対象病害虫「アザミウマ類」 防除方法 (薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000～3,000倍	1,000～3,000倍		
P275	リンゴ ブドウ	バスタ液剤	防除時期	リンゴは収穫21日前まで ブドウは収穫前日まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	リンゴは収穫21日前まで ブドウは収穫前日まで (雑草生育期)	5月29日
	モモ ナシ カキ オウトウ スモモ ウメ ネクタリン		防除時期	収穫前日まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	収穫前日まで (雑草生育期)	
	イチジク		防除時期	収穫前日まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	収穫前日まで (雑草生育期)	

○令和6年5月に失効した農薬

失効月日	農薬名	備考	備考欄
5月15日	ボトビカ水和剤	トマトP105,ミニマトP114	

注)最新の農薬登録情報を確認のうえ、農薬を使用すること。
注)メーカーにより使用基準が異なる場合があるため、ラベルに記載されている使用方法等を確認すること。